Bac Général SVT + SES (Sciences de la vie et de la Terre et Sciences économiques et sociales)

SUJET D'EXAMEN (SESSION OFFICIELLE)

Sciences de la vie et de la Terre - Session 2023

Sujet de l'examen national tel que publié pour la session indiquée. Source : sujets nationaux publiés par le ministère chargé de l'examen et les services académiques. Document mis à disposition par FormaV pour la révision.

Toutes les annales et leurs corrigés : https://bac-svt-ses.fr/annales-sujets-et-corriges

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

JOUR 1

Durée de l'épreuve : **3 h 30**

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

Répartition des points

EXERCICE 1	6 points
EXERCICE 2	9 points

EXERCICE 1 - Organisation fonctionnelle des plantes et production de matière organique (6 points)

Les parties aériennes des plantes terrestres sont des lieux de production de matière organique.

Montrer comment l'organisation et le fonctionnement des feuilles de la plante permettent la production de glucose et autres sucres solubles.

Vous rédigerez un texte argumenté. On attend des expériences, des observations, des exemples pour appuyer votre exposé et argumenter votre propos.

EXERCICE 2 - Le mode d'action d'un traitement anti-cancéreux (9 points)


Dans les tissus sains, les divisions cellulaires sont contrôlées. Au contraire, les cellules des tissus cancéreux se divisent de manière anarchique et ininterrompue. Le processus de division cellulaire nécessite de l'énergie.

Le 2DG (2-désoxy-glucose) est une petite molécule utilisée comme traitement anticancéreux. L'un de ses modes d'action se situe au niveau du métabolisme des cellules cancéreuses.

Argumenter l'utilisation de la molécule 2DG dans le traitement de certains cancers.

Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données issues des documents et les connaissances utiles.

<u>Document 1</u> : le métabolisme des cellules non cancéreuses



D'après ***Matthew G. Vander Heiden*** *et al., Science, 2009*

<u>Document 2</u> : consommation de dioxygène et production de lactate par des cellules cancéreuses et par des cellules non cancéreuses

Afin de caractériser le métabolisme des cellules cancéreuses, des scientifiques ont cultivé *in vitro* plusieurs types de cellules de souris en division. Ils ont déterminé leur consommation de dioxygène en condition aérobie et leur production de lactate en conditions aérobie et anaérobie.

On précise que les mitochondries restent fonctionnelles dans les cellules cancéreuses étudiées.


Le métabolisme des cellules cancéreuses est le même pour toutes les populations de cellules cancéreuses de cet exercice.

	Condition aérobie		**Condition anaérobie**
	Consommation moyenne de dioxygène (mm^3 d'O_2.mg^{-1}.h^{-1})	Production moyenne de lactate (mm^3 de lactate.mg^{-1}.h^{-1})	Production moyenne de lactate (mm^3 de lactate mg^{-1}.h^{-1})
Cellules cancéreuses	7	30	70
Cellules non cancéreuses	17	0	35

D'après ***Sidney Wein House*** *et al., Science, 1956*

<u>Document 3</u> : la voie métabolique du glucose et du 2DG dans une cellule

Ces voies métaboliques existent chez les cellules non cancéreuses et cancéreuses.



D'après ***Clothilde Laussel*** *et al., Biochemical Pharmacology, 2020*


Document 4 : la production de lactate et d'ATP par des cellules cancéreuses

Deux lignées cellulaires (HCT116 et LoVo) issues d'une tumeur d'un cancer colorectal[1] sont cultivées 24 heures en absence ou en présence de 2DG (*2-desoxy-glucose*) à différentes concentrations exprimées en $mmol.L^{-1}$ (mM). On détermine ensuite leur production de lactate et d'ATP.

[1]cancer affectant différentes parties du gros intestin.

Document 4a : l'effet du 2DG sur la production de lactate des 2 lignées


 # indique une différence significative par rapport à la situation en absence de 2DG.



D'après ***Dongsheng Zhang*** *et al., PLoS ONE, 2016*

Document 4b : l'effet du 2DG sur la production d'ATP des 2 lignées

 # indique une différence significative par rapport à la situation en absence de 2DG.




D'après ***Dongsheng Zhang*** *et al., PLoS ONE, 2016*

<u>Document 5</u> : le 2DG et la multiplication cellulaire

Des cellules d'une lignée cellulaire issues d'une tumeur d'un cancer du sein sont cultivées *in vitro* en absence de 2DG (*2-desoxy-glucose*) ou en présence de 12 nmol.L^{-1} (12 nM) de 2DG.

Pendant les trois jours suivants, on dénombre les cellules en culture. Les barres verticales représentent la dispersion des valeurs.



D'après ***RL Aft*** *et al., British Journal of cancer, 2002*

<u>Document 6</u> : l'activité de l'hexokinase

On mesure *in vitro* l'activité de l'hexokinase en présence de glucose et d'ATP, dans deux conditions :

- **condition 1** : absence de 2DG6P (*2-désoxy-glucose-6-phosphate*) dans le milieu ;
- **condition 2** : 10 mM de 2DG6P dans le milieu.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

	Activité de l'enzyme hexokinase (en UA)
Condition 1	1,1 ± 20%
Condition 2	0,37± 20%

D'après ***W Chen*** *et al., Biochimie, 1992*